

SUILENCE®

CEVA Santé Animale

Phéromones d'apaisement pour porcs

Contient :

Apaisine	100 ml par 500 ml
----------	-------------------

Qu'est-ce que Suilence ?

Pendant la lactation, la truie sécrète entre les mamelles une phéromone, signal chimique qui crée un sentiment de familiarité entre la mère et les petits de la même espèce. **Suilence** imite les propriétés de cette substance naturelle. Lors de situations d'inconfort pour les porcs (sevrage, regroupement, perturbation de l'environnement, changement des locaux, transport), **Suilence** crée un environnement familier qui contribue à atténuer les désagréments et les réactions des animaux motivées par le stress.

Mode d'emploi :

Suilence est à pulvériser dans l'environnement immédiat (murs, planchers, aire de repos) 2 heures avant l'arrivée des porcelets, avant tout stress prévisible (manipulations, soins, sevrage, etc.). **Suilence** pourra être pulvérisé à nouveau juste après le stress, à une distance de 20 cm environ de la surface. Exercer une pression complète du pulvérisateur pour une pulvérisation de 2 ml de **Suilence**.

Regroupement post-sevrage : Une pulvérisation pour 2 porcelets, environ 2 heures avant l'arrivée des animaux.

Dans certaines conditions particulières, une augmentation du nombre de pulvérisations peut être nécessaire, par exemple selon la densité de population, le type de sol, la ventilation, le type de chauffage, les odeurs fortes, la température ambiante, etc.

Mise en garde : Ne pas pulvériser directement sur les animaux ni sur leurs mangeoires et abreuvoirs.

DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.

PEUT IRRITER LES YEUX.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison.

Éviter tout contact avec les yeux.

Ne pas fumer.

Tenir hors de la portée des enfants.

N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.

PREMIERS SOINS : Contient du N-Méthyl-2-pyrrolidone et de l'Alcool isopropylique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement au centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 20 minutes.



DANGER

IRRITANT

INFLAMMABLE

Distribué par:

CEVA Santé Animale

La Ballastière - BP 126 – 33501 Libourne Cedex - **FRANCE**

Fabriqué par : **CEVA Santé Animale** - France

Marque déposée de : **CEVA Santé Animale**

Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. La responsabilité est aux lecteurs de se familiariser avec l'étiquette du produit ou le feuillet d'information de l'emballage.